


ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ




Καρεκλά Κατερίνα

Fetus

Placenta





ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

- Αμηνόρροια
- Αυξημένη Διούρηση
- Ναυτία / εμετοί
- Ζαλάδες
- Κόπωση
- Διόγκωση και ευαισθησία μαστών
- Απέχθεια/ επιθυμία τροφών
- Ευσυγκινησία

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

- Ανάλυση Αίματος
- Ανάλυση ούρων
- Υπερηχογράφημα
- Κλινική εξέταση

Τεστ Εγκυμοσύνης



Καρεκλά Κατερίνα

Pregnant


Not pregnant

A


B

C


D



Υπερηχογράφημα



Καρεκλά Κατερίνα






Καρεκλά Κατερίνα




Καρεκλά Κατερίνα

Διάρκεια Εγκυμοσύνης

- Εννέα μήνες → 40 εβδομάδες
- 1^ο τρίμηνο → Περίοδος προσαρμογής
- 2^ο τρίμηνο → Περίοδος ευεξίας
- 3^ο τρίμηνο → Περίοδος επιβάρυνσης






1st trimester



2nd trimester



3rd trimester

Μαστοί

Αύξηση όγκου
πλάσματος

Πλακούντας

Αμνιακό υγρό


Έμβρυο

Μήτρα

Λιπώδης ιστός




Καρεκλά Κατερίνα



Κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης εμβρύου

Οι 2-10 πρώτες εβδομάδες οι πιο κρίσιμες για την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Εάν συμβεί κάποιο λάθος δεν είναι αναστρέψιμο.

Ιστός



Εβδομάδες κύησης


Αυτόματη Αποβολή

- **Εμβρυικές ανωμαλίες** → ανικανότητα εμβρύου να αναπτυχθεί σωστά
- **Προβλήματα μητέρας**
 - → χρόνιες ασθένειες (διαβήτης, υπέρταση, σύφιλη, καρδιακές και νεφρικές παθήσεις κτλ),
 - → αλκοόλ, φάρμακα, ναρκωτικά
 - → έμμεσα φυσικά τραύματα (ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, δηλητηρίαση), άμεσα φυσικά τραύματα (πτώσεις, χτυπήματα)
 - → πολύ έντονες συγκινήσεις (πένθος, διαζύγιο)
- **Προβλήματα του γεννητικού συστήματος** → δυσπλασίες της μήτρας και ινομυώματα, ανεπάρκεια τραχηλικού στομίου

Ο ρόλος του πατέρα



Καρεκλά Κατερίνα



Καρεκλά Κατερίνα